

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ



ОЛИМП

ПАМЯТКА

**ПАЦИЕНТУ ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕНИЯ
ОПЕРАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ**

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ

*Рекомендации для
успешного заживления
и остеоинтеграции импланта*

Уважаемый пациент!

Поздравляем! Вам установлен дентальный имплантат, который является надежным заменителем корня утраченного зуба. От соблюдения послеоперационных рекомендаций зависит его приживление и долговечность всей конструкции.

1 В первые часы после операции:

- Не ешьте в течение 2–3 часов.
- Не полощите рот, не сплёвывайте активно, не используйте трубочку для питья.
- Не прикасайтесь к швам языком, пальцами или сторонними предметами.

2 В течение первых нескольких суток:

- Употребляйте только мягкую, прохладную пищу.
- Жуйте на противоположной стороне. исключите горячую, острую, солёную и кислую еду.

- Не курите и не употребляйте алкоголь.
- Избегайте перегрева (баня, сауна), физических нагрузок и сна на стороне вмешательства.
- В случае риска развития послеоперационного отека (об этом вам сообщит врач) рекомендуется первые сутки использовать в проекции вмешательства холодный компресс (лёд, обернутый тканью) интервалами по 15-20 минут.

3

Медикаментозная терапия:

- Принимайте обезболивающие и антибиотики строго по назначению врача.
- Не прекращайте курс антибиотиков до его завершения.
- Не используйте самостоятельно препараты или полоскания, не рекомендованные врачом.

4

Уход за полостью рта:

- Чистите зубы с первого дня, избегая области операции. используйте щётку с мягкой щетиной.
- Полоскания (например, раствором хлоргексидина) разрешены только с 2 дня — строго по назначению.
- Не используйте ирригатор, зубную нить и ёршики в зоне вмешательства минимум 2 недели.
- Избегайте агрессивной гигиены — механическое раздражение может спровоцировать воспаление.

5 Возможные явления:

- Допустимы умеренная боль, отёк и чувство давления в области импланта в первые 2–3 дня.
- Также возможны незначительные кровянистые выделения в течение первых часов.
- Если проведенная операция предполагает появление отека (об этом вам сообщит врач) будьте готовы, что отек достигает своего максимума на 2 сутки, и лишь затем начинает уменьшаться.

6 Срочно обратитесь к врачу, если:

- Боль усиливается на 3–5 сутки.
- Появляется гной, неприятный запах, значительный отёк, подвижность импланта.
- Повышается температура тела. Возникает онемение губ, подбородка или языка.

7 Контрольные осмотры:

- Явитесь на приём в установленный срок для снятия швов (обычно на 7–10 день) и контроля заживления.
- Не пропускайте контрольные визиты в течение всего периода остеоинтеграции.

ОЛИМП КЛИНИКА

стоматология и реконструктивная хирургия



Пролетарская, 12
Пролетарская, 15

+7 950 598 15 15

**Соблюдение этих рекомендаций —
ключ к успешной остеоинтеграции
имплантата и долгосрочному
результату лечения.**

*С уважением, Клиника стоматологии и
реконструктивной хирургии «Олимп»*

@olimp_clinic_kem

OLYMPSTOM.RU

