

Рекомендации после лечения с анестезией у ребёнка

Применение анестезии – неотъемлемая часть современной стоматологии

После того, как зуб вылечен, у ребёнка сохраняется ощущение онемения губ, щёк, языка, дёсен – ещё около 1-2 часов.

Также Вы можете заметить асимметрию лица за счёт снижения подвижности мышц со стороны проведения анестезии.

Не паникуйте!
Этот дискомфорт – временное явление.

Самое частое осложнение после анестезии – прикусывание губы или щеки. Обычно это нижняя губа.

Соблюдайте простые правила – и Вы сможете снизить дискомфорт и избежать осложнений:

- ★ В течение двух часов не давайте ребёнку пищу.
- ★ Объясните ребёнку, что кусать или сосать губу нельзя, даже если она «заморожена».
- ★ Постарайтесь отвлечь ребёнка и внимательно за ним следите.
- ★ По согласованию с доктором можно предложить тёплый чай или немного мороженого.



Если ребёнок испытывает сильный дискомфорт, можно использовать препарат Нурофен® (в возрастной дозировке, по согласованию с врачом).



Если ребёнок всё же травмировал губу или щёку она будет выглядеть так

Главное – не пугаться и не паниковать.

Это довольно частое и неопасное явление. Обычно всё проходит само в течение нескольких дней.



Что нужно сделать:

- ★ Дайте ребёнку антигистаминный препарат (Зодак, Цетрин, Фенистил) – по возрастной дозировке. Это уменьшит отёк.
- ★ Обрабатывайте место травмы:
 - Холисал стоматологический гель – 3-4 раза в день 5-7 дней
 - или Асепта защитный стоматологический гель – 3-4 раза в день 5-7 дней
- ★ При боли – дайте Нурофен® по возрастной дозировке
- ★ Не убирайте белую/жёлтую плёнку на месте укуса – это фибрин, он защищает ранку от инфекции и помогает заживлению.

Пожалуйста,
обязательно
поставьте
В известность
лечащего Врача

по телефону:

+7 950 598-15-15

Мы Всегда рядом
и готовы помочь!

